



----- *Harrison's Internal Medicine*

Figure 361-11. Acute onset of right hemiparesis. Transaxial noncontrast CT scan through the region of the basal ganglia reveals a hematoma involving the left putamen. This is a typical hypertensive hemorrhage.



----- *Harrison's Internal Medicine*

Figure 361-12. Subarachnoid hemorrhage. Sudden onset of headache and altered mental status. Noncontrast CT scan at the level of the suprasellar cistern revealed subarachnoid hemorrhage. Communicating hydrocephalus is present, indicated by dilation of the temporal horns of the lateral ventricle. Angiography demonstrated an aneurysm of the anterior communicating artery, which had ruptured.



2007. 01. 27

我四十歲，我中風了！

兩個月前，藝人趙舜舉辦感恩會，慶祝自己重生，因為一年前他被醫師宣判為「腦幹**栓塞**中風」，進行腦部各項檢查時才知道，他之前曾經小中風過卻不自知。

在台灣，中風最主要的上游是高血壓，同樣，可別以為高血壓是長輩的專利，很多年輕中風者，多在不知道自己已有高血壓的情況下，慘遭疾風襲擊。

很難想像，中風圖像已經從過去熟知的前行政院長孫運璿、前清華大學校長沈君山，轉為中壯年即中風的作家陳映真、企業家溫世仁、藝人陳松勇到趙舜，甚至更年輕化到五、六年級生，如地雷般在你我周遭引爆。

ICH

神經真奧妙

【劉秀枝／台北榮總一般神經內科主任、國立陽明大學神經學科教授】



有位36歲的先生開會時突然劇烈頭痛，隨即昏迷，被送急診，腦部電腦斷層顯示瀰漫性的蜘蛛膜下腔出血及嚴重腦水腫，這種情況大部分是腦血管的先天性微小動脈瘤破裂造成的。

一位73歲的老太太因為左眼皮逐漸下垂，有複視及輕微頭痛的症狀來看門診。醫師判斷為左側第三對腦神經麻痺，住院做腦部血管攝影，發現其腦血管有微小動脈瘤，因逐漸變大而壓迫到旁邊的第三對腦神經。神經外科醫師立刻安排開刀把此動脈瘤夾住，以免破裂。

同樣是腦血管的微小動脈瘤，一個是破裂而造成昏迷，一個是壓迫旁邊的神經而及早發現，能在破裂之前加以處理，因而保住了性命。所以同一種疾病可以用不同的症狀來表現。

2023/6/9

趙建勳前晚頭痛沒警覺「隔天叫不醒」葉克膜急救無效妻痛哭

前總統陳水扁女婿趙建勳的弟弟趙建勳9日突傳過世噩耗，趙家人治喪悲痛，趙建勳7日突喊頭痛，吃藥後緩解不以為意，不料8日中午呈現昏迷，家人趕緊送往奇美醫院，診斷為大腦動脈瘤破裂，經過插上葉克膜急救仍無效，下午1時11分宣告死亡，家屬預計19日在憶盧園舉辦公祭。

50歲的趙建勳突然過世，趙家人9日已將棺木停放在憶盧園，挑選靈堂致祭，趙太太情緒崩潰難以接受，回憶先生7日在家直喊頭痛，卻未警覺是腦部出問題，吃了1顆普拿疼止痛後緩解，還與家人共進晚餐。

趙建勳8日起床仍感不適，妻子中午時突然發現丈夫昏迷不醒，趕緊送往奇美醫院，被發現是腦部動脈瘤破裂，趙建勳曾是奇美醫院醫師，基於過去同事的特殊情誼，全院出動多名醫師會診施予急救。

趙建勳弟趙建勳動脈瘤破裂猝逝！ 醫示警2徵兆「這種頭痛」不能等

14:25 2023/06/09 中時新聞網

[郭冀銘](#)

如果在40歲或50歲後才出現第一次的頭痛，要特別警覺。突然發生如雷擊般的瞬間頭痛。

腦動脈瘤不是腫瘤，指的是一個腦血管的退化性疾病。在腦血管分支處血管壁因承受強大的血流直接衝擊逐漸變薄脆弱，時間久了形成不正常的凸起，稱之為腦動脈瘤。

而這樣的病變在日常很少產生症狀，不過一旦破裂往往造成嚴重腦出血，稱之為蜘蛛膜下腔出血。此為最嚴重的腦出血性中風，有將近5分之1的患者在到院前就死亡，到院者也有3分之1因其它合併症病逝。

腦動脈瘤破裂有三成機率當下死亡



腦動脈瘤有如不定時炸彈

醫師：養成健康的生活型態，可有效預防疾病！



成大醫院乳癌權威郭耀隆突然病逝，與他熟悉的乳房外科醫師及成大醫院高層證實，郭耀隆為腦動脈血管瘤破裂而猝世。當腦動脈血管瘤破裂，血液流入蜘蛛網膜下腔，便形成出血性中風，因無明顯症狀可以察覺，致命性高，如同體內的不定時炸彈，如果有突發爆炸性頭痛問題恐怕是警訊！

突然腦中風！乳癌權威郭耀隆離世成大醫院悲痛證實

前往 >

日前敏盛綜合醫院副院長江坤俊透露，其學長郭耀隆因突發腦中風病逝，但據了解，實際的病因為腦動脈破裂。

Heho健康
<https://heho.com.tw/archives>
乳癌權威郭耀隆「腦血管瘤破裂」驟逝！初期有這5 症狀快檢查

衛福部司長賴向華凌晨猝死家中 疑天冷心肌梗塞亡 享年56歲

08:25 2023/11/19 | 中時新聞網 | 楊雅婷



衛福部口腔健康司於2022年5月4日正式成立，賴向華是首任司長，賴向華從台大牙醫系一路念到博士，畢業後，先後到天主教耕莘醫院及母校台大醫院任職。

yahoo! 新聞

今日新聞
NEWS

65.4k 人追蹤

☆ 追蹤

中醫界大老施純全 今早宿舍猝死



記者鄭婷襄 / 高雄報導

2021年11月3日 · 1分鐘 (閱讀時間)



義守大學課程的學士後中醫學系的特聘教授
中醫師公會全聯會副理事長
據悉施純全多年前曾因心肌梗塞住院，但確切死因仍有待釐清。

曾站疫情第一線...北榮胸腔科主任柯信國猝逝 院長發聲

2025-01-24 12:36 聯合報／記者林琮恩／台北即時報導



53歲北榮胸腔科主任柯信國猝逝
醫院開具心肌梗塞死亡證明

台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國昨天出席台大醫院胸腔內科忘年會，返家時卻倒臥門口，送台北榮總急救後不治身亡。台北榮總院長陳威明指出，院方緊急啟動心血管相關團隊，可惜未能挽回，陳威明表示，昨晚十時許在辦公室接到柯信國之子，用父親手機撥來電話，說父親失去呼吸心跳。他感到震驚之餘，研判病情與心臟有關，立刻要求醫院心導管室團隊待命，並在柯信國一送至醫院即為他裝上葉克膜，急救長達1小時以上，最終仍不幸過世。

華航董座謝世謙心肌梗塞猝逝 醫：半數人發病前無異狀

2025-01-16 14:13 聯合報／記者林則澄／台北即時報導

+ 心肌梗塞



前旅日球星張誌家驚傳心肌梗塞逝！
青壯年猝死多因心血管出問題 醫提醒
3危險徵兆4生活型態易致命
2024-01-02 09:54:00



26歲男胸悶掛急診竟心肌梗塞！年輕心梗多因高血脂，吃燕麥能降LDL嗎？醫師給建議

2023-10-19 16:51:13 聯合報 元氣網 / 編輯葉姿岑整理

心肌梗塞典型症狀 持續胸悶合併氣喘、冒冷汗

心肌梗塞主要是冠狀動脈血管內的硬化斑塊破裂，引發急性血栓，阻塞了血管所致。典型症狀為持續胸痛、胸悶超過20分鐘，合併氣喘、冒冷汗、頭暈、心悸，或突然喘不過氣來。凡吸菸、肥胖、三高族群、患有第二型糖尿病、膽固醇過高，甚至有遺傳性家族病史，都是心肌梗塞的危險因子。

哪些人容易得到心肌梗塞？

1. 隨年齡增長而提高。男性大於45歲，女性大於55歲，又男性發生率高於女性。
2. 患有高血壓、糖尿病、高血脂等疾病者。尤其糖尿病患者常合併有三高，加上多重代謝異常，壞膽固醇容易囤積在血管內，造成大規模阻塞病變。
3. 情緒容易緊張、易怒、憂慮和恐慌者。
4. 過度勞累、生活壓力大者。
5. 缺乏規律運動習慣者。
6. 膽固醇、血脂肪及三酸甘油脂數值過高者。
7. 菸癮者，因抽煙會加速粥狀動脈硬化。
8. 冠狀動脈心臟病患者，或有冠狀動脈心臟病家族史者。患者因動脈硬化血管腔狹窄，很容易造成阻塞。

腦中風「每42分鐘1人喪命」2件事必做！遠離鬼門關

08:512023/11/19 中時新聞網

10月底起至今，乳癌名醫郭耀隆、體育主播詹啟聖、韓國主播金泰敏皆因腦出血而猝逝，根據衛福部最新統計，平均每42分鐘就有1人死於腦血管疾病，尤其最常發生在季節交替時，溫差變化使血管劇烈收縮所致，專家表示，腦中風爆發前幾乎無徵兆，建議三高族按時服藥控制病況，並且定期做腦部核磁共振檢查，做好以上2件事才能遠離鬼門關。

「幾乎每個腦中風患者都有一個共同特徵，就是『高血壓』！」黃祥銘說，如果血壓不穩定，一旦受到外來刺激就容易釀成心血管疾病，此外，三高患者、膽固醇高、吸菸也都是腦中風的危險因子。

每47分鐘就有1人死於腦中風 把握黃金3小時，中風是可控制的

•資料來源：衛生福利部

•建檔日期：105-10-27 更新時間：106-05-11

10月29日是世界中風組織（The World Stroke Organization）所訂定世界中風日（World Stroke Day 2016），今年主題是「中風是可治療的（Stroke is Treatable）」，強調辨識中風初期的重要症狀，把握黃金時間就醫，即時治療與積極復健，中風是可以有效控制的。

統計結果顯示60-79歲是中風發生率最高的年齡層

急性中風搶救黃金3小時-FAST(快、快、快)

民眾之中風類型以**缺血性中風為最多**，急性缺血性中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致之殘障等後遺症，因此若出現中風症狀，應立即送醫爭取治療時間。腦中風病發後的6個月是復健的黃金時期，運動能力恢復最快，掌握黃金復健期，積極配合醫療專業人員的復健治療計畫，能降低身體殘障程度，重拾日常生活功能，讓中風患者拋開病後憂鬱，讓生活更美好。國民健康署呼籲民眾牢記FA